



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno

tel: 24 355-71-00, fax: 24 355-71-01 www.gov.pl/web/psse-kutno
email: sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl

PPIS.EP.9011.1.85. 2023.ML

L.dz. 1340/2023

Kutno, dnia 07.07.2023 r.

Urzędy Gmin – powiat kutnowski
-wszyscy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w związku z otrzymaniem pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.06.2023 r. dotyczącego stwierdzenia na terenie Polski przypadków infekcji wśród kotów domowych, spowodowanych wirusem grypy ptaków A/H5N1 zaleca wprowadzić następujące nakazy dla osób zajmujących się hodowlą drobiu.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą:

1. pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
2. zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
3. karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
4. stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
5. stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków

Objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków

- zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje te objawy, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Szczegółowe informacje dotyczące ptasiej grypy pod linkiem: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow> oraz <https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-w-zwiazku-ze-stwierdzeniem-przypadkow-infekcji-wsrod-kotow-domowych-spowodowanych-wirusem-grypy-ah5n1>

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska